



Медичні аспекти здоров'я жінки

№ 4-5 (125-126)' 2019

Medical aspects
of woman's health

Медицинские аспекты
здоровья женщины



Тематичний випуск: патологія вагітності

Фуніт



*Легка перемога
над грибокком¹*



**Висока якість доведена сертифікатом біоеквівалентності
та захищена голограмним стікером²**



Інформація для фахівців медицини та фармацевтів, а також для поширення на семінарах і конференціях з медичної тематики. Повна інформація, а також листівки про можливі побічні реакції, містяться в інструкції для медичного застосування препарату.
¹ Скорочена інструкція за застосування препарату Фуніт. Склад: ітраконазол 100 мг. Фармакологічна група: Протигрибкові засоби для системного застосування. Підхід гризалолу. Показання: молочні, споринні нугрибітими до ітраконазолу збудники. Схема терапії: 2 капсули (200 мг) 2 рази на добу. Побічні ефекти: диспепсія, нудота, біль в області живота, запор | н. Р. с. МОЗ України №UA/5014/01/01.
² Література: 1. Матсьяк на увазі широкий спектр дії. Інструкція для медичного застосування препарату Фуніт: 2. Орел, гандомак, single oral dose, 2-period, stoppage trial to assess the bioequivalence of itraconazole 100 mg itraconazole capsules and Sporozol 100 mg capsules in 24 healthy volunteers, 2005. Представництво компанії Нобель в Україні, 04074, Київ, вул.Львівська, 2а; тел.: (044) 582004; www.nobel.com.ua

Привычное невынашивание беременности:
диагностические и терапевтические подходы

Рекомендации Немецкого, Австрийского и Швейцарского
обществ гинекологии и акушерства 2018



Медичні аспекти здоров'я жінки

Медицинские аспекты здоровья женщины

Офіційне друковане видання Асоціації акушерських анестезіологів України
Журнал для лікаря-практика

Заснований у липні 2006 р.

Періодичність видання – 8 разів на рік

Журнал представлений у базі даних «Наукова періодика України» та індексується Google Scholar



Национальная библиотека Украины
имени В. Т. Вернадского



№ 4-5 (125-126) 2019

Зміст



АКУШЕРСТВО

Цукровий діабет і вагітність

Клінічна лекція

З.М. Дубоссарська, В.Т. Нагорнюк 5

Привычное невынашивание беременности: диагностические и терапевтические подходы

Рекомендации Немецкого, Австрийского и Швейцарского обществ гинекологии и акушерства 2018. 13

Особенности ведения вагитных з проміжним станом мікробіоценозу піхви на фоні високого інфекційного ризику

Н.С. Луценко, О.Д. Мазур, Р.В. Слухенська 29

Сепсис в акушерстві: сучасні лікувальні та діагностичні підходи

Є.В. Гржимальський, А.Й. Гарга 38

Сравнительный анализ фармакологической эффективности ангиопротекторных препаратов в терапии синдрома задержки роста плода

О.И. Клычева, А.Б. Хурасева 55

ГІНЕКОЛОГІЯ

Профілактика та лікування проявів генітоуринарного менопаузального синдрому у жінок із використанням терапевтичної методики на основі плазми, збагаченої тромбоцитами

О.В. Ромащенко, В.М. Григоренко, В.В. Білоголовська, О.В. Бабич 21

Сучасний менеджмент кандидозного вульвовагініту 36

Вагиниты: возможности и преимущества комбинированной локальной терапии

Н.В. Хомяк, В.И. Мамчур 46

Інноваційні підходи до лікування уrogenітальних інфекцій

А.Д. Дюдюн 60

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

Вирусные гепатиты у женщин репродуктивного возраста

И.А. Зайцев 67

ЗАПИСНА КНИЖКА

Дайджести 20, 28, 45

Анонси 73, 75

БІБЛІОТЕКА
Дніпропетровської
державної медичної академії

флебодіа®

600 МГ діосмін

Дві проблеми - одне рішення!

Полегшення симптомів лімфовенозної недостатності^{1,2,3}

1 таблетка на добу

біль • тяжкість • трофічні розлади

Флеботонік та ангіопротектор³

Пролонгована дія

флебодіа
600 МГ діосмін

Швидке зменшення симптомів геморою^{3,4,5,6}

3 таблетки на добу

біль • набряк • кровотеча

Склад лікарського засобу: 1 таблетка містить діосмін, що відповідає 600 мг діосміну безводного чистого.

Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

Фармакотерапевтична група. Ангіопротектори. Капіляростабілізуючі засоби. Біофлавоноїди.

Код АТХ С05С А03.

Показання.

- Полегшення симптомів лімфовенозної недостатності: важкість у ногах, біль, трофічні розлади.
- Комплексне лікування функціональних станів, що супроводжуються підвищеною проникністю капілярів.
- Лікування функціональних симптомів гострого геморою.

Протипоказання.

Гіперчутливість до компонентів препарату, особливо у пацієнтів, схильних до алергічних реакцій на кошіль червону А (Е 124). Препарат не рекомендується застосовувати у період годування груддю.

Спосіб застосування та дози.

Для перорального застосування.

- **Лімфовенозна недостатність:** 1 таблетка на день вранці перед сніданком. Тривалість курсу лікування визначає лікар залежно від перебігу захворювання. Середня тривалість лікування становить 2 місяці.
- **Гострий геморою:** 2-3 таблетки на день під час прийому їжі протягом 7 днів. Якщо після лікування симптоми геморою не зникають, слід звернутися до лікаря для корекції лікування. Максимальна добова доза – 1800 мг (3 таблетки).

Побічні реакції.

Можливі алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, свербіж. Рідко можливі диспептичні розлади, головний біль. Поодинокі випадки шлунково-кишкових розладів, які рідко призводять до припинення лікування.

Категорія відпуску.

Без рецепта. **Виробник.** Іннотера Ш.У.І., Франція / Innothera Chouzy, France. Реєстраційне посвідчення № UA/8590/01/01 Наказ Міністерства охорони здоров'я України 01.08.16 № 1422

¹ R. Barbe Etude de la durée d'action du Dioveron avec contrôle par pléthysmographie, Tribune médicale, 1988, n°270, p49-50.

² Cazaubon M. et al. Etude comparative d'acceptabilité, d'efficacité et de tolérance de deux formes galéniques de diosmine 600 mg, dans le traitement des symptômes de la maladie veineuse chronique. Angiologie, 2011, vol.63, n°2.

³ SmPC Phlebotonik 600 mg (diosmin). Im-coated tablet.

⁴ Chauvenet M., Libeskind M. Intérêt de la diosmine d'hémisynthèse dans la poussée hémorroïdaire aiguë. Essai multicentrique randomisé en double insu versus placebo. Rev Fr Gastro-Enterol 1994; 303: 3-8.

⁵ Kecmanovic D. et al – The use of Phlebotonik® in the management of bleeding non-prolapsed haemorrhoids. Acta Chirurgica Iugoslavica 2005, 52, 1, 115-116

⁶ Debien P., Denis J. Traitement des signes fonctionnels de la crise hémorroïdaire aiguë: Essai multicentrique, randomisé, diosmine d'hémisynthèse versus association extrait de Ginkgo biloba-heptaminol troxérutine. Med Chir Dig 1996; 25(5): 259-64.



Представництво «Лаботорія Іннотек Інтернаціональ» в Україні, 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська/Михайлівська, буд. 6/5.

Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.

14057