



# Медичні аспекти здоров'я жінки

## Медицинские аспекты здоровья женщины

Офіційне друковане видання Асоціації акушерських анестезіологів України  
Журнал для лікаря-практика

Заснований у липні 2006 р. Періодичність видання — 8 разів на рік


Журнал представлений у базі даних «Наукова періодика України» та індексується Google Scholar

Національна бібліотека України  
імені В. І. Вернадського

Google  
scholar

№ 6 (127) 2019

## Зміст



### АКУШЕРСТВО

**Гестаційний діабет: надання медичної допомоги під час вагітності**  
Методичні рекомендації для акушерів-гінекологів,  
сімейних лікарів, терапевтів та ендокринологів

Т.В. Авраменко, І.М. Мелліна, Л.М. Бикова ..... 5

**Швидке відновлення після операції кесарів розтин**

Д.Р. Шадлун, Є.В. Гріжимальський, А.Й. Гарга ..... 24

**Гострий мезентеріальний венозний тромбоз на фоні  
вагітності великого строку**

Клінічний випадок та огляд літератури ..... 27

**Оптимізація лікування вагінальної кровотечі, спричиненої  
ретрохоріальною гематомою у вагітних**

О.Г. Горбатюк, О.В. Васьків, А.П. Григоренко,  
А.С. Шатковська, А.М. Біньковська, В.Ю. Онишко ..... 41

**Влияние абляции эндометрия на исходы  
последующей беременности** ..... 63

### ГІНЕКОЛОГІЯ

**Менеджмент менопаузи: переваги та ризики призначення  
менопаузальної гормональної терапії**

Огляд конференції  
Тобі де Вільєрс, О.Л. Громова ..... 14

**Переоценка подходов к диагностике и лечению  
воспалительных заболеваний органов малого таза,  
обусловленных хламидийной инфекцией**

О.В. Ромащенко, А.В. Руденко, Л.Ф. Яковенко ..... 17

**Исследование PRISM: сравнительная оценка эффективности  
Полижинакса и миконазола в качестве эмпирического  
лечения инфекционных вагинитов** ..... 36

**Анатомія стресового нетримання сечі у жінок**

В.І. Горовий, О.І. Яцина ..... 47

### МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

**Инфекции мочевыводящих путей: настоящее и будущее  
препарата Цисто-аурин** ..... 32

**Лауреати нобелівської премії з медицини та фізіології 2019** ... 65

### ЗАПИСНА КНИЖКА


**Дайджести** ..... 31, 46, 68, 69

**Анонси** ..... 71

БІБЛІОТЕКА  
Дніпропетровської  
державної медичної академії

Ністатин, Неоміцин, Поліміксин В

Унікальна комбінація широкого  
спектру дії для ефективного  
лікування вагітиту\*



**ПОЛІЖИНАКС**  
Застосовувати  
інтравагінально ввечері  
перед сном 1 капсулу на  
добу. Курс лікування –  
12 дб, профілактичний  
курс – 6 дб.



**ПОЛІЖИНАКС  
ВІРГО**  
Для застосування  
у дитячій гінекологічній  
практиці.  
Вміст 1 капсули вводитьи  
інтравагінально (попередньо  
вирівнявши ніжку капсули)  
перед сном протягом 6 днів  
лікування.

**Лікування вагітиту, спричиненого  
чутливими мікроорганізмами:\***

- бактеріальний вагініт;
- рецидивуючий неспецифічний вагініт;
- вагініт, спричинений грибами роду *Candida* (*Candida albicans* і *Candida non-albicans*).

**Профілактика інфекційних  
ускладнень:\***

- перед встановленням внутрішньоматкового засобу, абортном;
- перед і після діатермокоагуляції шийки матки;
- перед пологами.

14058



«Лабораторія Іннотек Інтернаціональ»  
Представництво в Україні: 01001, Київ, вул. М.Житомирська, 4,  
тел. (044) 276 38 38, виробники Іннотек Шуві (Франція).

\*Інструкція для медичного застосування препарату Полижинакс та Полижинакс Вирго. Склад: 1 капсула вагінальна містить неоміцину сульфат 25 000 МД, поліміксину В сульфат 25 000 МД, ністатин 100 000 МД. Формула препаратів: Ністатин, Поліміксин В та антибіотичні засоби для застосування у гінекології. Антибіотики: Ністатин, комбінація: Код: ІХХ 0214 151. Показання: Лікування вагітиту, обмеженого чутливими до препарату мікроорганізмами, у тому числі: бактеріальний вагініт, обмеженої бактеріально-мікобіотичної мікрофлори; рецидивуючий неспецифічний вагініт; вагініт, спричинений грибами роду *Candida* (*Candida albicans* і *Candida non-albicans*); вагініт, спричинений змішаною інфекцією. З метою профілактики інфекційних ускладнень Полижинакс рекомендується застосовувати перед прикладом внутрішнього контрацептивного приладу на статеві органи, перед абортном, встановленням внутрішньоматкового засобу, перед і після діатермокоагуляції шийки матки, перед проведенням внутрішньоматкових та внутрішньоуретральних обстежень, перед пологами. Протипоказання: Підвищена чутливість до будь-якого компонента (включно з допоміжними) препарату. Через наявність однієї складової Полижинакс протипоказаний дітям з алергією до однієї з складових. Застосування у період вагітності або годування груддю. У жінок, що розвивають вагітність на даний час не було відзначено не пов'язаних з тривалістю вагітності ускладнень або фетопатозів. Спостережень за вагітністю, що завдала впливу цього лікарського засобу, недостатньо, щоб виключити будь-які ризики. Кому застосування препарату у період вагітності можливе лише за призначенням лікаря у тих випадках, коли обумовлена користь для матері перевищує потенційний ризик для плода. Через відсутність даних щодо призначення препарату у грудне молоко застосування цього препарату слід уникати у період годування груддю. Полижинакс (далше способи застосування) без існуючих без існуючих додати ще одне предпозначення: \* Полижинакс Вирго. Спосіб застосування та дози: Необхідно надістати загостреній ніжку капсули ніччечем. Після цього вкати 1 капсулу вкати інтравагінально ввечері перед сном, протягом 6 днів лікування. Не применшувати лікування під час менструації. Спосіб застосування та дози. Дорослим застосовувати інтравагінально ввечері перед сном 1 капсулу на добу. Курс лікування – 12 дб, профілактичний курс – 6 дб. Не слід прерувати курс лікування під час менструації. Категорія вагітності. За ризиком: Р1 (U) (05/05/01/01) Ніжка МІЗ №1019 від 25.12.2014, ІІІ (Z) (24/01/01) Ніжка МІЗ №245 від 07.08.2014. Інформація спеціалізованим лікарським формуванням зразків. Претензій для використання в професійній діяльності медичних або фармацевтичних працівників. Працюючи режим інформації, виготовленої в цьому виданні або при поширенні матеріалу на спеціалізованих заходах, в першу чергу визначається Законом України «Про науково-технічну інформацію» №3222-XI від 25.06.1993р.