

Здоровье МУЖЧИНЫ


№3 (74) '2020

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ
С МАЯ 2002 ГОДА

ISSN 2412-5547 (Online)

ISSN 2307-5090 (Print)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ СЕКСОЛОГОВ И АНДРОЛОГОВ УКРАИНЫ



**ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
СЕКСОЛОГИЧЕСКИХ
ПАЦИЕНТОВ**

7

**ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСПЕКТ ИV
У БОЛЬНЫХ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ
ГИПЕРПЛАЗИЕЙ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**

16

**НАШ ОПЫТ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ПАРЦИАЛЬНОЙ НЕФРЭКТОМИИ:
ТЕХНИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ**

22

**ГИПЕРСЕКСУАЛЬНОСТЬ
У ЖЕНЩИНЫ: СЛУЧАЙ
ИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ**

52

**ДИСПАРЕУНИЯ КАК
КЛИНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА**

65



Флосін®

тамсулозину гідрохлориду 0,400 мг

Лікування функціональних розладів з боку нижніх сечовивідних шляхів при доброякісній гіперплазії передміхурової залози!

- Швидкий початок дії*
- Уроселективний¹; не викликає клінічно значущого зниження АТ²
- Діє цілодобово³

СКОРОЧЕНА ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування лікарського засобу ФЛОСІН® (FLOSIN®)¹

ЛІКАРСЬКА ФОРМА. Капсули тверді з модифікованим вивільненням. **ПОКАЗАННЯ.** Лікування функціональних розладів з боку нижніх сечовивідних шляхів при доброякісній гіперплазії передміхурової залози. **ПРОТИПОКАЗАННЯ.** Підвищена чутливість до діючої речовини, вкляюючи медикаментозно-індукованій ангіонгібрин, або до будь-якої допоміжних речовин лікарського засобу; ниркова недостатність; артеріальна гіпертензія; тяжка печінкова недостатність. **СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ.** Одна капсула щодня, яку приймають після сніданку або першого вживання їжі за день. **ПОВІННІ РЕАКЦІЇ:** запаморочення, головний біль, нудота, запаморочення, швидкий серцебиття, ортостатична гіпотензія; риніт; запор, діарея, нудота, блювання; висипання, свербіж, кропив'янка, ангіонгібрин, розладді ерекції, вкляюючи ретроградну еякуляцію і недостатність еякуляції, пріазм, астения та інші. **КАТЕГОРІЯ ВІДПУСКУ.** За рецептом. **За повною детальною інформацією звертайтеся до інструкції для медичного застосування лікарського засобу ФЛОСІН®, затвердженої наказом МОЗ України № 1635 від 07.09.2018, РП. № UA/R350/01/01.**

Виробник ФЛОСІН® – Менаріні – Фон Хейден ГмБХ. Місцезнаходження. Лейпцігер штрассе 7-13, 01097, Дрезден, Німеччина.

1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ФЛОСІН®, затверджена наказом МОЗ України № 1635 від 07.09.2018, РП. № UA/R350/01/01. 2. Lepor H. Phase III multicenter placebo-controlled study of tamsulosin in benign prostatic hyperplasia. Tamsulosin Investigator Group/Urology. 1998. Jun; 51(6):892-900. 3. Lowe FC. Summary of Clinical Experiences With Tamsulosin for the Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia. Reviews in Urology. 2005;7(супр):4-51/5-21. 4. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ПРОСТАМОЛ® УНО, затверджена наказом МОЗ України № 91 від 17.01.2020, РП. № UA/1041/01/01.

3. Фармакологічні властивості.

За додатковою інформацією щодо лікарських засобів звертайтеся до Представництва «Берлін-Хемі / А. Менаріні Україна ГмБХ», м. Київ, 02098, вул. Березинівська, 29. Тел.: +38 (044) 494 33 88. Факс: +38 (044) 499 33 69. Інформація про лікарські засоби, інформація для професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників. UA_Р_03-2020_V1_Press. Останній перегляд 11.02.2020.

Простамол® УНО

густого створеного естракту із похідної палими нілмолпадіної (Serenoa repens) 320 мг

Лікування дорослих чоловіків із утрудненим сечовипусканням при доброякісній гіперплазії передміхурової залози I та II стадії за класифікацією Alken¹

- Гальмування росту тканин передміхурової залози^{1*}
- Зменшення розладді сечовипускання²
- Протизапальна і протинабрякова дія^{3*}
- Не впливає на статеву функцію⁴

СКОРОЧЕНА ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування лікарського засобу ПРОСТАМОЛ® УНО (PROSTAMOL® UNO)¹

ЛІКАРСЬКА ФОРМА. Капсули м'які. **ПОКАЗАННЯ.** Простамол® УНО застосовується для лікування дорослих чоловіків із утрудненим сечовипусканням при доброякісній гіперплазії передміхурової залози I та II стадії за класифікацією Alken. **ПРОТИПОКАЗАННЯ.** Підвищена чутливість до діючої речовини або до інших допоміжних речовин. **СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ.** Лікування. Простамол® УНО приймають по 1 м'якій капсулі 1 раз на добу в одній тій же час. **ПОВІННІ РЕАКЦІЇ:** нудота, блювання, діарея, біль у животі (особливо при прийомах препаратів натще); частота мезоріа – алергічні реакції або реакції гіперчутливості; головний біль. **КАТЕГОРІЯ ВІДПУСКУ.** Без рецепта.

За повною детальною інформацією звертайтеся до інструкції для медичного застосування лікарського засобу ПРОСТАМОЛ® УНО, затвердженої наказом МОЗ України № 91 від 17.01.2020, РП. № UA/1041/01/01.

Виробник ПРОСТАМОЛ® УНО – БЕРЛІН-ХЕМІ АГ. Місцезнаходження. Гліп-кер Бер 125, 12489, Берлін, Німеччина.



СОДЕРЖАНИЕ 3 (74)/2020

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

- Психотерапевтическое консультирование
сексологических пациентов
И.И. Горпинченко, Н.В. Турчак 7

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ

- Підсумкові матеріали 22-го Конгресу Європейського
товариства сексуальної медицини (Частина 3)
Ю.М. Гурженко, В.В. Спиридоненко,
О.Ю. Гурженко 12

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

- Дослідження ПРОСПЕКТ IV (ПРОСтамол:
Перспективи Комбінованої Терапії) у хворих
на доброякісну гіперплазію передміхурової
залози
Ю.М. Гурженко, В.В. Спиридоненко 16

- Наш досвід лапароскопічної парціальної
нефрэктомії: техніка і результати
С.В. Головка, В.Р. Балабаник 22

- Результати лапароскопічного лікування стриктури
мисково-сечовідного сегмента
у поєднанні із сечокам'яною хворобою
М.Д. Соснін, В.А. Слободянюк, А.А. Грицаюк 28

- Віддалені результати органозберігальних операцій
при видаленні кістозних пухлин нирок категорії
III–VI за Bosniak
О.М. Кваша, О.М. Ухаль, М.І. Ухаль 32

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

- Возможности терапии хронического простатита
с помощью макромицета *Flammulina velutipes*
И.И. Горпинченко, В.В. Спиридоненко 35

- Ензимологічні індикатори ішемічного ушкодження
паренхіми нирки у хворих на сечокам'яну хворобу
(Клініко-експериментальне дослідження)
С.О. Возіанов, В.В. Черненко, Г.Г. Нікуліна,
Л.Я. Мигаль, Н.І. Желтовська, Д.В. Черненко,
А.Л. Клюс, І.Є. Сербіна, С.В. Нікітаєв,
В.Й. Савчук 42

- Оценка эффективности препарата Фармапрост
в монотерапии у пациентов с комбинацией
доброкачественной гиперплазии предстательной
железы I степени и хронического абактериального
простатита
А.М. Корниенко, М.А. Щербак 47

- Гиперсексуальность у женщины:
случай из клинической практики
Г.С. Кочарян 52

СЕКСОЛОГИЯ И АНДРОЛОГИЯ

- Syndrome of anxious expectation of sexual failure (fear
of sexual failure) in males: some aspects
of its formation
G.S. Kocharyan 57

- Застосування ацетилцистеїну в лікуванні пацієнтів
із хронічним простатитом/синдромом хронічного
тазового болю
І.І. Горпинченко, К.Р. Нуріманов, Т.В. Порошина,
В.С. Савченко, Г.М. Драннік 62

- Диспареунія як клінічна проблема
Г.С. Кочарян 65

УРОЛОГИЯ

- Застосування гемостатичних препаратів
для профілактики геморагічних ускладнень
екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії
каменів нирок та верхньої третини сечоводів
С.О. Возіанов, А.О. Юрах, В.О. Мазурець,
О.О. Шевчук 75

- Порівняльне оцінювання результатів контактної
пневмоцистолітотрипсії та електрогідролітичної
цистолітотрипсії
С.О. Возіанов, В.В. Черненко, В.Й. Савчук,
Д.В. Черненко, С.Т. Соколенко, Ю.М. Бондаренко ... 80

- Динаміка відновлення функціонального стану
паренхіми нирки та нормалізація основних факторів
ризиків кальцій-оксалатного нефролітіазу в сечі на тлі
застосування комплексної метафілактики
С.О. Возіанов, В.В. Черненко, Г.Г. Нікуліна,
Л.Я. Мигаль, Н.І. Желтовська, Д.В. Черненко,
І.Є. Сербіна, В.Й. Савчук, Р.Є. Ладнюк 85