

ГОСТРІ ТА НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ

у практиці лікаря®

3 (66) 2017

urgent.com.ua

- Декомпенсація цукрового діабету у хворих із гострими порушеннями мозкового кровообігу
- Порушення водно-електролітного балансу та їх корекція




ЦІННІСТЬ ВИЩА ЗА ВАРТІСТЬ

ВОЛЮТЕНЗ®

ГЕКОТОН®

ГЕКОДЕЗ®



ІННОВАЦІЙНІ ПЛАЗМОЗАМІННИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ВІД «ЮРІЯ-ФАРМ»

Інформація про рецептурний лікарський засіб для професійної діяльності спеціалістів в галузі охорони здоров'я:

Гекотон Реєстраційне посвідчення № UA13324/01/01. Фармакологічна група. Кровоазаміники та перфузійні розчини. Препарати гідроксіетилкрахмалу. Код АТХ B05A A07. Склад: діючі речовини: 100 мг розчину містить гідроксіетилкрахмалу 120/0/4 5,0 г; каліюму 5 г; натрію лактату 1,5 г; натрію хлориду 0,8 г; калію хлориду 0,02 г; натрію хлориду 0,02 г; магнію хлориду 0,02 г. Показання. Профілактика та лікування гіповолемії та шоку внаслідок хірургічних втручань, інфекційних захворювань, травм та опіків; терастатичне розведення крові (гемодіаліза) в лікувальному метео. Протипоказання. Підвищена чутливість до діючих речовин (у т.ч. алергія на крохмаль), стан гіпергідратації, гіперволемія, ниркова недостатність, що супроводжується олигурією або анурією (кreatинін ≥ 177 мкмоль/л), гіперосмолярна кома, гіпернатріємія (натрієвий дефіцит), ацидоз, ацидоз, також гіповолемія, виражена тромбоцитопенія, період проведення сеансів гемодіалізу. Гекотон не слід вводити у випадках, коли протипоказано введення рідини (вмірний внутрішньочеревний крововилив, інтенсивна зхвороба III ст.). Особливі обсервації: рекомендується проявляти особливу увагу з набором легень, серцево-судинною декомпенсацією, тяжкими хронічними захворюваннями печінки, дегідратацією (в цьому випадку рекомендується провести заміщення рідини кристалідами). Спосіб застосування та дози. Препарат вводять внутрішньовенно крапельно. Максимальна добова доза (у випадку виняткових випадків допускається перевищення) - 20 мл/кг/добу (1400-1600 мл на добу).

Гекодез Реєстраційне посвідчення № UA13672/01/01. Фармакологічна група. Кровоазаміники та перфузійні розчини. Препарати гідроксіетилкрахмалу. Код АТХ B05A A07. Склад: діючі речовини: гідроксіетилкрахмаль 1 мг розчину містить гідроксіетилкрахмаль із середньою молекулярною масою 200000 і середнім молекулярним замінником 0,5 (гідроксіетилкрахмаль 200/0,5) - 60 мг; допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Показання. Гіповолемія, спричинена гострою крововтратою, у випадках, коли застосування тієї ж кристаліди вважається недостатнім.

Протипоказання. Гіперчутливість до складових препаратів, гіпергідратація, гіперволемія, виражена гіпергідратація, хронічна серцева недостатність, тяжкі порушення системи згортання крові, тяжка гіперхлоремія, внутрішньочеревний або черевний крововилив, виражена печінкова недостатність, стан дегідратації, коли потрібна корекція водно-електролітного балансу, виявлення сенситивності до ГЕК, ниркова недостатність чи замісна ниркова терапія, тяжка коагулопатія. Набряк легень. Препарат протипоказаний пацієнтам із сенсисом, опіками, із трансплантованими органами та критично хворим пацієнтам через ризик ураження нирок та легяного пасиді.

Добова доза і швидкість введення розчину залежать від об'єму крововтрати, необхідності підтримки або відновлення гемодинамічних параметрів. Максимальна добова доза Гекодезу® не повинна перевищувати 50 мл/кг маси тіла, ще відповідно до ГЕК/ст/добу (біля 3500 мл/добу при масі тіла пацієнта 70 кг).

Волютенз Реєстраційне посвідчення № UA 13338/01/01. Фармакологічна група. Кровоазаміники та перфузійні розчини. Препарати желатину. Код АТХ B05A A06. Показання. Профілактика і лікування відносної або абсолютної гіповолемії або шоку. Профілактика артеріальної гіпотензії (у тому числі при індуції ендотрахеальної або спінальної анестезії). Процедура, що включають екстраординарний кровообіг (у тому числі на апараті «серце та легені») гостра нормоволемічна гемодіалізація. Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату. Гіпергідратація, гіперволемія. Тяжка серцева недостатність. Тяжка ниркова недостатність. Нещодавно перенесений інфаркт міокарда. Тяжкі порушення згортання крові. Гіпергідратомія, гіпернатріємія. Дегідратація. Максимальна доза з токсикологічної точки зору обмежень дози немає. Максимальна добова доза визначається ступенем гемодіалізу. Слід дотримуватись обережності, щоб уникнути зниження гематокриту нижче критичних значень. Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник. ТОВ «Юрія-Фарм».
Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності. Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Вербовацького, 168.
Тел./факс: (044) 281-01-01.








urgent.com.ua


Передплатний індекс 95403





Шановні читачі!

Завітайте на наш оновлений сайт. Ми сподіваємося, що кращий дизайн та вдосконалена функціональність сайту зроблять перебування на електронному ресурсі нашого видання ще приємнішим!



У оновленій версії сайту Ви знайдете:

- більш зручний пошук матеріалів, можливість сортувати їх за розділами, темами тощо;
- україномовну, російськомовну та англомовну версії видання;
- корисні посилання на авторитетні для лікарів ресурси;
- анонси найцікавіших науково-практичних заходів, присвячених гострим та невідкладним станам

ГОСТРИ ТА НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ
у практиці лікаря



ЗМІСТ

КОМОРБІДНА ПАТОЛОГІЯ

Декомпенсація цукрового діабету у хворих із гострими порушеннями мозкового кровообігу <i>О.А. Галушко</i>	5
--	---

ІНФЕКТОЛОГІЯ

Діагностика й лікування госпітальної пневмонії: практичний підхід.....	11
--	----

АКАДЕМІЯ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ

Порушення водно-електролітного балансу та їх корекція. Частина 1. Корекція порушень обміну натрію <i>Д.О. Дзюба, А.Б. Диня, І.А. Гаан, О.А. Галушко</i>	17
Алкогольний делірій <i>С.М. Недашківський, А.М. Богдан, Н.А. Кренбі, О.А. Галушко</i>	22

ХІРУРГІЧНА ПАТОЛОГІЯ

Актуальні питання застосування антибіотиків при перитоніті.....	27
---	----

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

Ведення пацієнтів із бронхіальною астмою <i>Керівництво Шотландської міжколегіальної мережі із розробки клінічних рекомендацій (SIGN)</i>	33
--	----